

2010 年版兽药典三部增、修订品种

品名	中国兽药典(2010 年版三部)
<p>鸡传染性鼻炎 (A 型+C 型)、新城疫二联灭活疫苗</p>	<p>[修订] 名称变更; 新增【装量检查】项; 修订【性状】的剂型和黏度; 修订【安全检验】和【效力检验】(1) 项。</p> <p><b>【装量检查】</b> 按附录 页进行检验, 应符合规定。</p> <p><b>【性状】</b> 剂型 为<u>油包水型</u>。取一清洁吸管, 吸取少量疫苗滴于<u>清洁冷水表面</u>, 除第 1 滴外, 均应不扩散。</p> <p>黏度 按附录 页黏度测定法第二法进行, 应不超过 <u>200CP</u>。</p> <p><b>【安全检验】</b> 用 <u>20~90</u> 日龄 SPF 鸡 10 只, 每只颈背部皮下注射疫苗 1.0 ml, 观察 14 日, <u>应不出现因疫苗引起的局部或全身不良反应</u>。</p> <p><b>【效力检验】</b> (1) 鸡传染性鼻炎部分 用 <u>4~6</u> 周龄 SPF 鸡 20 只, 10 只各皮下注射疫苗 0.25 ml (<u>含 1 羽份</u>), 另 10 只作对照。接种 <u>30 日</u>后, 取免疫鸡和对照鸡各 5 只, 每只鸡各眶下窦内注射副鸡禽杆菌 C-Apg-8 株 (CVCC 254) 培养物 0.2 ml (<u>含至少 1 个发病剂量</u>), 另免疫鸡和对照鸡各 5 只, 每只鸡各眶下窦内注射副鸡禽杆菌 Apg-668 株培养物 0.2 ml (<u>至少 1 个发病剂量</u>), 观察 <u>14 日</u>。对照组均应至少发病 (<u>面部一侧或两侧眶下窦及周围肿胀或流鼻涕或兼有流泪者</u>) 4 只, 免疫组均应至少保护 4 只。</p>