

2010 年版兽药典三部增、修订品种

品名	中国兽药典(2010 年版三部)
<p>鸡新城疫、传染性 法氏囊病二联灭活 疫苗</p>	<p>[修订] 新增【装量检查】项；修订【性状】的黏度项；修订【效力检验】(2) 项。</p> <p>【装量检查】 按附录 页进行检验，应符合规定。</p> <p>【性状】 黏度 按附录 页黏度测定法第二法进行，应不超过 200CP。</p> <p>【效力检验】</p> <p>(2) 鸡传染性法氏囊病部分 下列方法任择其一。</p> <p>血清学方法 用 21 日龄 SPF 鸡 15 只，10 只各颈背部皮下注射疫苗 1 羽份，另 5 只作对照。接种 28 日后，每只鸡各采血，分离血清，测定鸡传染性法氏囊病病毒中和抗体。对照鸡平均中和抗体效价应不高于 1:10，免疫鸡平均中和抗体效价应不低于 1:5000。</p> <p>免疫攻毒法 用 21 日龄 SPF 鸡 15 只，10 只各颈背部皮下注射疫苗 1 羽份，另 5 只作对照。接种 28 日后，用鸡传染性法氏囊病 BJQ902 株强毒攻击，每只点眼、口服 0.2 ml (含 $10^{5.0}$BID₅₀)，72 小时后全部剖杀，检查法氏囊，对照组鸡应至少有 4 只出现法氏囊病变，免疫组鸡法氏囊应正常。</p>