

2010 年版兽药典三部增、修订品种

品名	中国兽药典(2010 年版三部)
<p>水貂病毒性肠炎 灭活疫苗</p>	<p>[修订] 新增。</p> <p style="text-align: center;">水貂病毒性肠炎灭活疫苗</p> <p style="text-align: center;">Shuidiao Bingduxingchangyan Miehuoyimiao Mink Viral Enteritis Vaccine, Inactivated</p> <p>本品系用水貂病毒性肠炎病毒 SMPV18 株, 接种猫肾细胞系 (F81 或 CRFK 株) 培养, 收获培养物, 经甲醛溶液灭活后, 加氢氧化铝胶制成。用于预防水貂病毒性肠炎。</p> <p>【性状】 本品静置后, 上层为粉红色清凉液体, 下层为淡粉红色沉淀, 沉降物为全量 1/2 左右。</p> <p>【装量检查】 按附录 页进行检验, 应符合规定。</p> <p>【无菌检验】 按附录 页进行检验, 应无菌生长。</p> <p>【安全检验】 用 49~56 日龄健康易感水貂 5 只, 各皮下注射疫苗 3.0 ml, 观察 7 日, 应全部健活。</p> <p>【效力检验】 下列方法任择其一。</p> <p>(1) 用兔或豚鼠检验 用体重 1.0~1.5 kg 兔 3 只或体重 350 g 左右的豚鼠 3 只, 各皮下注射疫苗 1.0 ml, 14 日后采血, 测 HI 价, 应不低于 1:32。</p> <p>(2) 用水貂检验 用 49~56 日龄健康易感水貂 3 只, 各皮下注射疫苗 1.0 ml, 14 日后采血, 测 HI 抗体效价, 应不低于 1:32; 接种后 14 日, 与同条件的对照貂 3 只, 各口服强毒液 15 ml, 观察 5 日, 对照貂应全部发病, 免疫貂应全部健活。</p> <p>【甲醛含量测定】 按附录 页进行测定, 应符合兽用生物制品通则的规定。</p> <p>【规格】 (1) 40 ml/瓶 (2) 100 ml/瓶</p> <p>【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存, 有效期为 6 个月。</p>