

2010 年版兽药典三部增、修订品种

品名	中国兽药典(2010 年版三部)
<p>兔病毒性出血症、 兔多杀性巴氏杆菌 病二联灭活疫苗</p>	<p>[修订] 新增。</p> <p>兔病毒性出血症、兔多杀性巴氏杆菌病二联灭活疫苗</p> <p>Tu Bingduxingchuxuezheng Tu Duoshaxing Bashiganjun Erlian Miehoumiao</p> <p>Rabbit Viral haemorrhagic Disease and <i>Pasteurella multocida</i> Vaccine, Inactivated</p> <p>本品系用兔病毒性出血症病毒皖阜株和荚膜 A 群多杀性巴氏杆菌 C51-17 株 (CVCC1753) 分别接种兔和适宜培养基, 收获感染兔的实质脏器和培养物, 经甲醛溶液灭活后, 分别加入氢氧化铝胶, 然后按适当比例混合制成。用于预防兔病毒性出血症和兔多杀性巴氏杆菌病。</p> <p>【性状】 灰褐色均匀混悬液, 静置后上层为黄棕色的澄明液体, 下层有少量沉淀。</p> <p>【装量检查】 按附录 页进行检验, 应符合规定。</p> <p>【无菌检验】 按附录 页进行检验, 应无菌生长。</p> <p>【安全检验】 皮下注射 2~5 月龄易感健康兔 4 只, 每只 4.0 ml, 观察 10 日, 应全部健活。</p> <p>【效力检验】 (1) 兔病毒性出血症病毒部分 用 2~5 月龄易感健康兔 4 只, 每只皮下注射疫苗 1.0 ml, 14 日后, 连同对照兔 4 只, 各皮下注射 10 倍稀释的兔病毒性出血症病毒强毒 (肝、脾毒) 1.0 ml, 观察 7 日, 对照兔应至少死亡 3 只, 免疫兔应全部健活。</p> <p>(2) 多杀性巴氏杆菌部分 用 2~5 月龄易感健康兔 4 只, 每只皮下注射疫苗 1.0 ml, 21 日后与对照兔 4 只, 各皮下注射多杀性巴氏杆菌 C51-17 株 1 MLD, 观察 10 日, 对照兔应全部死亡, 免疫兔应至少 3 只健活。</p> <p>【甲醛和汞类防腐剂残留量测定】 分别按附录 和 页进行测定, 应符合兽用生物制品通则的规定。</p> <p>【规格】 (1) 20 ml/瓶 (2) 40 ml/瓶 (3) 100 ml/瓶</p> <p>【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。</p>